

সম্প্রসাৰণ বুলেটিন নং ৫/২০০৪

পশুৰ চৰকা (F.M.D.) ৰোগ

ডা° দীপক কুমাৰ শৰ্মা

সহকাৰী পশু-চিকিৎসক

ড° মনোৰঞ্জন নেওগ

প্ৰশিক্ষণ সংগঠক



কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, খুমটাই,
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাঘাট

পশুৰ চৰকা (F.M.D.) ৰোগ

চৰকা বা খুৰাফঁটা ৰোগ (Foot and Mouth Disease) পশুৰ এবিধ ভয়াবহ সংক্ৰামক ৰোগ। বৰ্তমান বিশ্বৰ প্ৰায় ২০ খন মান দেশ এই ৰোগৰ পৰা মুক্ত, কিন্তু আমাৰ দেশত এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এতিয়াও উল্লেখনীয়। ভাৰতত এই ৰোগৰ ফলত বছৰি আনুমানিক প্ৰায় ৫০০ কোটি টকা লোকচান হয়।

ৰোগৰ কাৰণ : চৰকা এবিধ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা বেমাৰ। ভাইৰাছবোৰ খালি চকুৰে মনিব নোৱাৰি, অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তহে ইহঁতক দেখা যায়। চৰকা ভাইৰাছৰ কেবাটাও প্ৰকাৰ আৰু উপ-প্ৰকাৰ (Sub type) আছে। বৰ্তমান সাতটা প্ৰকাৰ যেনে - 'ও', 'এ', 'চি', এচিয়া, এছ. এ. টি, এছ. এ. টি, এছ. এ. টি, আৰু আশীৰ ওপৰত উপ-প্ৰকাৰ আছে। ভাৰতবৰ্ষত হোৱা চৰকা ৰোগৰ প্ৰথম চাৰিটা প্ৰকাৰ আৰু এ নামৰ এবিধ উপ-প্ৰকাৰ পোৱা গৈছে।

সাধাৰণতে সকলো ধৰণৰ ঘৰচীয়া আৰু বণৰীয়া প্ৰাণী এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। উন্নত আৰু বৰ্ণ সংকৰ জাতৰ গৰুৰ ক্ষেত্ৰত ই মাৰাত্মক ধৰণেৰে হোৱা দেখা যায়। মানুহো কেতিয়াবা চৰকা জীৱাণুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে, এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জুনৰ পৰা চেপ্তেম্বৰ মাহত বেছিহোৱা দেখা যায় যদিও বছৰৰ যিকোনো সময়তেই ই হ'ব পাৰে।

(ক) দূষিত বায়ুৰ দ্বাৰা : আক্ৰান্ত জন্তুৰ লালটিৰ লগত এই ভাইৰাছ বহু পৰিমাণে নিঃসৰিত হয়। পাছত ই ধূলিকণাৰ লগত মিহলি হৈ বতাহত উৰি ফুৰে আৰু আনকি ৬০ মাইল পৰ্যন্ত যাব পাৰে। বতাহৰ লগত মিহলি হোৱা চৰকা ভাইৰাছৰ জীৱনী শক্তি অৱশ্যে তাপ, আৰ্দ্ৰতা, বৰষুণ আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।

(খ) আক্ৰান্ত জন্তু : নিৰোগী প্ৰাণী আক্ৰান্ত প্ৰাণীৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। আক্ৰান্ত প্ৰাণী এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যোৱাৰ ফলত নতুন ঠাইতো এই বেমাৰ বিয়পিব পাৰে।

বেমাৰী গাই গৰুৰ গাখীৰতো ভাইৰাছবোৰ আছে আৰু সেই গাখীৰ খোৱাৰ ফলত পোৱালি বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে।

ৰোগত মৃত্যু হোৱা জন্তুৰ হাড়, মজ্জা, চাল আদিত ভাইৰাছবোৰ কিছুদিনলৈ জীয়াই থাকে আৰু 'শ' ভালদৰে সৎকাৰ নকৰিলে সুস্থ জন্তু তাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে।

বেমাৰী প্ৰাণীৰ আলপৈচান ধৰা বা চিকিৎসা কৰা মানুহৰ কাপোৰ-কানি, জোতা আদিত এই ভাইৰাছবোৰ লাগি থাকিব পাৰে আৰু তেনে মানুহ আন ঠাইলৈ গৈ নিৰোগী প্ৰাণীক ৰোগাক্ৰান্ত কৰি তুলিব পাৰে।

চৰকা হৈ থকা ঠাইৰ ঘাঁহ, খেৰ আদিতো জীৱানু বহুদিন জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা আন ঠাইতো বেমাৰ বিয়পি পৰিব পাৰে।

বাহক প্ৰাণী : বেমাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো গৰুৰ টনছিল, অস্ত্ৰ আদিত ভাইৰাছ প্ৰায় ২ বছৰ তিনি মাহ পৰ্যন্ত থাকিব পাৰে। এনে জন্তুৰে ৰোগৰ লক্ষণ নেদেখুৱায় কিন্তু ভাইৰাছ বহন কৰি ফুৰে। তেনেকৈ ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত বেমাৰ হৈ যোৱাৰ ৯ মাহ পাচলৈকে এই ভাইৰাছ বহন কৰি বেমাৰ বিয়পায়।

আক্ৰান্ত জন্তুৰ বীৰ্য্য : আক্ৰান্ত যাঁড় গৰু প্ৰজনন কাৰ্য্যত ব্যৱহাৰ কৰিলে বা বেমাৰী যাঁড়ৰ বীৰ্য্যৰ দ্বাৰা কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰালেও বেমাৰ সুস্থ প্ৰাণীৰ গালৈ বিয়পিব পাৰে।

ছিটাৰ দ্বাৰা : কেতিয়াবা চবকা ভাইৰাছ অন্য ৰোগৰ ছিটাৰ লগত মিহলি হোৱাৰ ফলত এই ৰোগ বিয়পি পৰিব পাৰে।

ৰোগৰ লক্ষণ : ভাইৰাছ সুস্থ প্ৰাণীৰ দেহত সোমোৱাৰ দুইৰ পৰা আঠ দিন মানৰ ভিতৰত ৰোগৰ লক্ষণ দেখা যায়। চবকাত আক্ৰান্ত জন্তুৰ সাধাৰণতে জ্বৰ উঠে, লাহে লাহে অৱশ্যে হৈ আহে, অভোক হয়। খীৰতী গাইৰ গাখীৰ কমে। কেই ঘণ্টামানৰ ভিতৰত জিভা, ওঁঠ, দাঁতৰ আলু, খুৰাৰ মাজ আদি ৰঙা পৰে আৰু পানী জোলা বান্ধে। মুখেৰে ফেন আৰু লালতি ওলাব ধৰে। খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হয়। ওহাৰ আৰু বাটত কেতিয়াবা পানী জোলা বান্ধে। কেতিয়াবা গৰ্ভৱতী গাইৰ পোৱালি অকালতে নষ্ট হব পাৰে। বৰ্ণসংকৰ গৰুৰ কেতিয়াবা মৃত্যুও হোৱা দেখা যায়। পোৱালিয়ে আন কোনো বাহ্যিক লক্ষণ নেদেখুৱাকৈয়ে মৃত্যু মুখত পৰে।

গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত বাকীবোৰ লক্ষণ প্ৰায় একে যদিও মুখেৰে লালটি নোলায়। গাভিনী গাহৰিৰ গৰ্ভপাত হয়। ওহাৰ আৰু বাটত পানীজোলা বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়।

চবকা ৰোগৰ চিকিৎসা : চবকা ৰোগৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা নাই। তথাপিও বেমাৰৰ উপশম ঘটাবলৈ আৰু আৰোগ্য প্ৰক্ৰিয়াক তড়িত কৰিবলৈ কিছু চিকিৎসা দিয়া প্ৰয়োজন যেনে —

(১) ১৫ গ্ৰাম (৩ চামুচ) বৰিক পাউদাৰ ১ লিঃ পানীত মিহলাই মুখ জিভা আদি ভালকৈ প্ৰতিদিনে ধুই দিব লাগে।

(২) ১ গ্ৰাম পটাছিয়াম পাৰমাঙ্গানেট তিনি লিটাৰ পানীত মিহলাই মুখ ভৰিৰ ঘা আদি দিনে তিনিবাৰকৈ ধুই দিব লাগে।

(৩) ১ চামুচ ফিটকিৰি ১ লিটাৰ পানীত মিহলাই মুখ/ঠেঙৰ ঘাঁ দিনত দুই/তিনিবাৰ ধুব লাগে।

(৪) ধুওৱাৰ পাছত ১ গ্ৰাম বৰিক পাউদাৰ ১০০ মিঃ লিঃ গ্লিচাৰিনত মিহলাই মুখৰ ঘাত লগাব লাগে।

খুৰাৰ ঘাত ৪০ মিঃ লিঃ ফিনাইল ১ লিটাৰ পানীত মিহলাই সদায় ধুব লাগে। নাইবা ৪০ গ্ৰাম জিঙ্ক অক্সাইড ১ লিঃ পানীত মিহলাই ধুব লাগে। খুৰাৰ ঘাত যদি পোক লাগে পোকবোৰ উলিয়াই দি

তাৰপিন তেল কপাঁহত লগাই ঘাঁত লগাব লাগে। তাৰোপৰি ঘাঁত দিয়া বিভিন্ন মলমো লগাব পাৰি। ওহাৰ আৰু বাটৰ ঘাঁত এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীম দিনত তিনিবাৰকৈ লগাব পাৰি।

ইয়াৰ উপৰিও আক্ৰান্ত জন্তু আন জীৱাণুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নোহোৱাকৈ ৰাখিবলৈ হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে এণ্টিবায়টিক আদি দৰৱৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। আক্ৰান্ত প্ৰাণীক দুৰ্বল নহ'বৰ বাবে খনিজ পদাৰ্থৰ মিশ্ৰণ, ভাতৰ মাৰ, জুলীয়া দানা, কোমল গছ-পাত আদিৰ যোগান ধৰিব লাগে। অতি দুৰ্বল হ'লে চেলাইন আদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা :

উপযুক্ত ছিটা প্ৰদানেৰে এই বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়। বজাৰত এই ৰোগৰ বিভিন্ন ছিটা পোৱা যায়। ছিটা সদায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতেহে দিয়াব লাগে। সঘনে চৰকা আক্ৰান্ত অঞ্চলত প্ৰতিষেধক ছিটা প্ৰতি চাৰিমাহৰ অন্তৰত দিয়াব লাগে। ছিটাৰ উপৰিও আৰু কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বনৰ প্ৰয়োজন আছে। যেনে - (ক) ওচৰত চৰকা হোৱাৰ খবৰ পালে সেই ঠাইৰ জন্তু, মানুহ, জন্তুৰ খোৱা খাদ্য আদি গোহালিত সোমাব দিব নালাগে। গোহালিৰ মজিয়া মাজে-সময়ে আধা কেজি কাপোৰ ধোৱা চৌড়া ১০ লিটাৰ পানীত মিহলাই ধুই দিব লাগে। (খ) ঘাঁহ-খেৰ আদি আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰা আনিব নালাগে। (গ) আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰা জীৱ-জন্তু কিনি আনিব নালাগে। (ঘ) নিৰোগী প্ৰাণীক আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ প্ৰাণীৰ লগত একে লগে চৰি ফুৰিব দিব নালাগে। (ঙ) আক্ৰান্ত খিৰতী গাইৰ গাখীৰ গৰম নকৰাকৈ পোৱালীক খাবলৈ দিব নালাগে। (চ) চৰকা লক্ষণ এবাৰ দেখা দিয়াৰ পাচত ছিটা দিয়াটো নিৰৰ্থক। গোহালিত কোনো জন্তুৰ গাত বেমাৰৰ লক্ষণ দেখা দিলে সুস্থ হৈ থকা জন্তুবোৰকো ছিটা দিব নালাগে। (ছ) ৰোগাক্ৰান্ত প্ৰাণীক নদী বা আন বোৱতী পানীত বান্ধি ৰাখিব নালাগে। (জ) আক্ৰান্ত প্ৰাণীৰ মৃত্যু হলে য'তে-ত'তে নেপেলাই দ' গাঁত কৰি পুতি পেলাব লাগে।